







Analyzované % složení těla



SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA

Lidské tělo se skládá ze čtyř základních stavebních látek. Voda, proteiny, minerální látky a tuk.

Součet jejich hmotností udává výslednou hmotnost těla v kg. Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vnitrobuněčné (ICW) a mimobuněčné (ECW) vody. Celková voda, proteiny a minerální látky nevázané v kostech tvoří měkkou beztukovou hmotu (SLM). Celková voda, proteiny a všechny minerální látky vytvářejí beztukovou hmotu (FFM). Standardní rozsah je rozmezí hodnot jednotlivých složek, slouží pro porovnání naměřených parametrů.



GRAF SLOŽENÍ TĚLA V PROCENTECH



Vyjadřuje poměr jednotlivých stavebních látek v procentech k Vašemu skutečnému složení těla a porovnává se se standardní skladbou těla.

„Nerovnováha základních stavebních látek, může vykazovat tyto příznaky“



- Nadbytečný tuk/obezita
- Nedostatek minerálů/osteoporóza
- Nevyvážená voda/edém
- Nedostatek bílkovin/podvýživa

Hmotnost těla

81,7 kg

rozsah

65,4-88,4

Kosterní sval

42 kg

rozsah


33,2-40,6

Tělesný tuk


8,3 kg

rozsah

9,2-18,4





Existují tři typy svalů: srdeční sval, útrobní sval a **kosterní sval**. Nicméně množství kosterního svalu se dá nejvíce měnit pomocí cvičení. Porovnáním procenta tělesného tuku a kosterní svalové hmoty, nalezené v každém tělesném segmentu, můžeme analyzovat velmi přesně úroveň obezity.



Tělesný tuk je jedním z nejsledovanějších parametrů lidského organismu. Ukazuje totiž nejen na rizika týkající se zdravotního stavu jedince, ale také na fyzickou zdatnost a výkonnost. Je zároveň také nejvariabilnější složkou tělesné hmotnosti, která se především během ontogeneze jedince neustále vyvíjí. Díky této své vysoké variabilitě je také dobře ovlivnitelná a to hned několika způsoby. Mezi nejvýznamnější faktory patří především výživová opatření a pohybová aktivita. Můžeme zde mluvit o zdravém a aktivním životním stylu.

Zkontrolujte, zda Váš zdravotní stav se podobá tvarům v grafu.





Analýzu těla můžeme rozdělit na segmentální a nesegmentální. Nesegmentální analýza znamená, že výsledky se zobrazí jako celek. Tuto analýzu provádějí běžné BIA přístroje.

Přístroje InBody s technologií DSM-BIA, provádí segmentální analýzu. Díky tomu zobrazí rozložení v jednotlivých segmentech těla. Segmentální analýza slouží k posouzení vyváženosti celého těla a je schopna odhalit dysbalance postavy. InBody přístroje změří hmotnost beztukové složky a procento tukové složky v každém segmentu těla a po té ji vyhodnotí.

Pomocí segmentální analýzy můžete porovnávat **SLM** i **TUK** (kg i %) horní a dolní končetiny mezi sebou, pravou a levou stranu těla. Navíc také srovnat horní a dolní polovinu těla. Netuková tkáň v segmentech poukazuje na to, jak dobře je vyvážená naše levá a pravá polovina těla a také v jakém poměru je horní a dolní polovina těla.

Vyvážení těla „SLM“ nám dává cenné informace, pomocí kterých lze doporučit typy a způsoby cvičení. Odhalíte tak i různé zlozvyky, které mají za následek větší zatěžování jedné ze stran těla, popřípadě i různá svalová onemocnění. Nepleťte si prosím ale SLM (Soft Lean Mass) a SMM (Skeletal Muscle Mass).

Vyvážení těla „TUK“, ukazuje na rozdělení tělesného tuku. Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíte, do jakého segmentu těla se tuk ve zvýšené míře ukládá.

Segmentální analýzou tuku zjistíte, kde je Vaše „slabé“ místo. Pak už zbývá pouze lékařem nebo specialistou na výživu vhodně nastavený program, který povede ke správnému hubnutí. Díky segmentální analýze se kontroluje průběh hubnutí mnohem snáze, protože velmi snadno poznáte, zda hubnete správně tuk nebo přibíráte sval.

Pozn.: Vaše segmentální hodnoty jsou diagnostikovány vždy bez hlavy a části krku.

Vyváženost postavy můžete také snadno a přehledně sledovat přímo na stupnici. Pokud je Vaše tělo vyvážené, ukazatel bude ve středu stupnice. V případě dysbalance je vzdálenost ukazatele od středu tím větší, čím větší je rozdíl ve vyváženosti těla.

Vyvážená postava



Nevyvážená postava



W = Index retence tělesné vody (ECW/TBW)

ECW mimobuněčná voda + ICW nitrobuněčná voda = TBW celková tělesná voda

F = Index retence tělesné tekutiny (ECF/TBF)

ECF mimobuněčná tekutina + ICF nitrobuněčná tekutina = TBF celková tělesná tekutina

PRAVÁ RUKA



0,37

0,32

LEVÁ RUKA



0,37

0,32


TRUP



0,37

0,33


PRAVÁ NOHA



0,38


0,33

LEVÁ NOHA



0,38

0,33



Lidské tělo je přibližně z 50 až 60% vody. Tato voda **TBW** je rozdělena do dvou hlavních oddílů - intracelulární **ICW** a extracelulární **ECW**, v poměru přibližně 2:1. Extracelulární tekutina se dále dělí na intersticiální tekutiny a plazmy, v poměru 3:1.

Společně tedy členění vypadá asi takto:



Většina vody v lidském těle je intracelulární **ICW** tedy nitrobuněčná voda, která je uvnitř svalů a orgánů. Obecně platí, že zdraví lidé udržují poměr extracelulární tedy mimobuněčné vody **ECW** a celkové tělesné vody **TBW** u 0,380. Rozsah pro zdravého člověka **ECW / TBW** je **0,360 až 0,390**.

Index retence tělesné vody (kapaliny) se zvyšuje, když se snižuje vnitrobuněčná voda, vázaná ve svalech, nebo když se zvyšuje mimobuněčná voda, vázaná hlavně v podkoží a tukové tkáni. Pokud je index retence tělesné vody (kapaliny) v některé části těla vyšší než je jeho průměrná hodnota, dochází ke vzniku edému, neboli otoku.

Lidé s více než 0.400 z ECW/TBW mohou mít zvýšené riziko onemocnění spojených s otoky a mohou potřebovat podrobnější vyšetření.

Tekutina je univerzálním pomocníkem, který se v našem těle podílí na všech činnostech týkajících se látkové a energetické přeměny. Je v buňkách, v cévách, v mezibuněčných prostorech, v tělesných dutinách a v trávicím traktu. Slouží jako regulátor teploty těla, maže klouby a šlachy a umožňuje činnost svalů. Zabezpečuje zpracování a přeměnu živin, které přijmeme stravou, "rozveze" je na všechna potřebná místa v těle a ty nežádoucí zase z těla vyloučí.

V tělesných tekutinách je rozpouštědlem voda a v ní jsou rozpouštěny látky v ionizované nebo neionizované formě. Ionizovanou formu představují elektrolyty, tj. látky, které po rozpouštění ve vodě tvoří kladné nebo záporně nabitě částice: kationty a anionty. V tělesných tekutinách probíhají veškeré metabolické pochody. Udržení optimálního množství a složení tělesných tekutin je nezbytnou podmínkou pro činnost orgánů, pro základní životní funkce. Rozsah pro zdravého člověka **ECF / TBF** je **0,310 až 0,350**.



BMI

23,4 bodů

rozsah

18,5-25

 $BMI = \text{hmotnost (kg)} / \text{výška}^2 \text{ (m}^2\text{)}$

PBF

10,1 %

rozsah

10-20

 $PBF = \text{hmotnost tuku (kg)} / \text{váha (kg)} \times 100$

WHR

0,8 poměr



rozsah

0,8-0,9

 $WHR = \text{obvod pasu (cm)} / \text{obvod boků (cm)}$

Držte se dál od „skutečné“ obezity!

Obezita leží na procentu tělesného tuku a na poměru boku a pasu, než na hmotnosti. I když vypadáte dobře zvenku, nemusí to být uvnitř totéž. InBody test vám pomůže poznat lépe složení Vašeho těla!



BMI = SHODNÉ



Váha 56 kg

Váha 56 kg



Body mass index (kg/m^2), je index sloužící k určení stupně obezity na základě výpočtu hmotnosti, vzhledem k výšce. BMI může pouze diagnostikovat obezitu na úrovni hladiny váhy a výšky.

Také proto BMI údaj není vhodný pro všechny, udává méně přesné údaje především u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Např. muži, kteří mají více svalové hmoty, tím pádem mají větší tělesnou hmotnost, by podle indexu BMI spadali do skupiny nadváhy či obezity, při tom jejich tělesný tuk je v těle na normální hranici, tudíž o obezitě nemůže být řeč!

PBF je procentuální podíl tělesného tuku na Vaší váhu. PBF bere v potaz podíl hmotnosti tělesného tuku k Vaší hmotnosti pro určení stupně obezity. Váha, sama o sobě, nemusí nutně definovat obezitu, ale spíše více svalové hmoty přináší vyšší body mass.



Procentuální podíl tělesného tuku je důležitější než tělesná hmotnost v diagnostice obezity.

WHR je poměr obvodu mezi pasem a bokem, slouží k určení břišní obezity. Ta je silně spojená s břišním tukem, zejména však s útrobním.


WHR, větší než 0,90 u žen a 0,95 u mužů, je považován za abdominální obezitu. U dospělých je abdominální obezita většinou způsobena hromaděním útrobního viscerálního tuku, který zvětší koncentraci volných tukových molekul v krevních cévách. To způsobuje onemocnění související s obezitou, jako je hypertenze, kardiovaskulární choroby a diabetes.



Měřené místo:

-obvod pasu

-obvod boku



VFA

rozsah

32,9 cm²>100cm²


Útrobní tuk - Viscerální tuk (VFA)

Viscerální tuk se hromadí v útrokách Vaší břišní dutiny, kde může prorůst do jiných orgánů. Nejvíce viscerálního tuku do sebe váže blanitá struktura, která se nazývá až skoro liturgicky „omentum“. Omentum je struktura uvnitř břišní dutiny odvozená od pobřišnice a připojená k povrchu žaludku. Pokud „omentum“ příliš naroste, stává se z něho Vaše vlastní „časovaná bomba“.

Většina lidí ani neví, že má nějaký útrobní tuk. Ten je velmi nebezpečný pro jejich zdravotní stav. Jakmile útrobní tuk přesáhne hranici 100 cm², začíná se ukládat do vnitřních částí orgánů.

Čím více se pohybuje nad 100 cm², tím více se zhoršuje Váš zdravotní stav.

ŘEZ BŘIŠNÍ DUTINOU V OBLASTI PUPKU.



Vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale také při velmi nízkém příjmu, nižším než je Vaše minimální bazální potřeba. Organismus reaguje tak, že i toto minimum energie začne ukládat (tzv. "na horší časy") a tím nabourává celý Váš metabolismus. "Pozor na hladovění", je jedno z nejzákladnějších pravidel zdravé výživy. Lidské tělo díky hladovění a nepravidelné stravě, může ukládat velké množství útrobního tuku, který posléze způsobuje vážné zdravotní problémy:

- ☐ Podporuje leptinovou či inzulinovou rezistenci a zpomaluje metabolismus (to následně podporuje obezitu)
- ☐ Hromadí do sebe tuk, aby ho potom vypouštěl do krve (stoupají triacylglyceroly a zvyšuje se riziko vzniku krevních sraženin)
- ☐ Způsobuje ztuhnutí jater, pankreatu a ledvin, dokonce i obalení celého srdce silnou vrstvou tuku
- ☐ Může spotřebovat až čtvrtinu celého vašeho inzulinu, poškodí jeho receptory po celém těle a vyvolá inzulinovou rezistenci (v důsledku toho vám vyskočí i hladina cukru v krvi)
- ☐ Produkuje zdraví nebezpečné látky (zejména TNF-alpha - tumor necrosis factor alpha a IL-6 - interleukin 6), které způsobují chronický zánět, vyčerpávají imunitní systém, poškozují důležité orgány a vyvolávají rakovinu
- ☐ Vytlačuje přední stěnu břišní (obézní muž s velkým břichem nemá zvenčí na sobě 50 cm silnou vrstvu podkožního tuku, ale má v sobě 20 kilo žluté třaslavé hmoty, která ho pomalu zabíjí) a může vyvolat kýlu anebo zauzlení střev
- ☐ Způsobuje ukládání tuku i v oblasti hrdla a to může být příčinou chrápaní a poruch nočního dýchání, což se může vyvinout až do klasického apnoe - zastavení dýchání

Velký vliv na množství vnitřního tuku má pravidelné dodržování příjmu i výdeje energie, spánku a omezení stresu. Pokud naše tělo nehladoví, hýbe se a neprožívá náhlé změny (teplota, psychika, nemoc.), nemusí si ukládat energii „na horší časy“.

STOP HLADOVĚNÍ



BCM

48,3 kg

rozsah

38,4-47

Celková hmotnost buněčné hmoty v těle

BMC

4,16 kg

rozsah


3,3-4

Celková hmotnost kosterních minerálů

AMC

29,2 cm


Obvod levé paže bez tuku

↑
AMC


BCM →

← BMC

NORMÁLNÍ KOST



OSTEOPORÓZA



BCM - aktivní hmotnost těla - tvoří metabolický režim těla. Všechna spotřeba kyslíku, produkce oxidu uhličitého, oxidace glukózy, proteinů a další metabolické práce probíhají v těle buňky. Tělesná buněčná hmota je ve skutečnosti, celková hmotnost všech buněčných elementů v těle, a proto představuje metabolicky aktivní složky v těle.

Svalovou tkáň vytváří z 60% buněčná hmota z celkové hmotnosti BCM, z 20% tkáně a orgány a z 20% červené krvinky a tkáňové buňky, které obsahují většinu tělesného draslíku (98-99%).



BMC - obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Nejvýznamnějším vitamínem v mineralizaci kostí je vitamín D. Ten najdeme v rybím tuku, vejci, mléku a v ořechách.

Pokud je v těle nedostatek vitamínu D, vede to k demineralizaci kostní tkáně. Pokud se v kostech vyskytne nadbytek měkké kostní tkáně, vede to ke kostním deformitám. Hodnota minerálních látek je velmi důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, při kterém dochází k řídnutí kostí.

Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty.

AMC - obvod svalstva paže. Jeden z nejspolehlivějších způsobů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Na základě obvodu svalstva paže zjistíme velmi zřetelně stav podvýživy, kdy ochabuje svalová hmota a důsledkem je zmenšení AMC. Tento údaj je oceňovaný zejména v nemocnicích u dlouhodobě nemocných, ležících a starších osob, kdy dochází k ochabování svaloviny vlivem fyziologických změn v těle a také vlivem nedostatečně biologicky hodnotné stravy.

Obvod paže se používá pro vyhodnocení hladiny bílkovin společně s AMC. Obvod se zmenšuje, když se zmenšuje sval, nebo když se snižuje podkožní tuk. Jestliže dojde ke změně obvodu, ale ne u AMC, potom došlo ke změně u podkožního tuku.



BMR

1956

kcal

rozsah

1720-2020

Bazální metabolický výdej

BMA

25,1

roků

Metabolický věk

ABSI

0,071

index

rozsah

0,079

Index tvaru těla / zdraví



BMR je minimální množství energie pro udržení základních životních funkcí pro srdce, mozek, plíce a pro termoregulaci. Jestliže bude hmotnost a výška stejná u různých osob, osoba s více svaly, bude mít vyšší **BMR**. Z tohoto důvodu bude potřebovat pro udržení životních funkcí více energie a je možné, že bude mít i hodnotu vyšší než je normální rozsah v závorkách.

ABSI - A BODY SHAPE INDEX.

ABSI - Index tvaru těla. Je daleko přesnější než všeobecně používaný index BMI. ABSI totiž zohledňuje také obvod pasu. Může také informovat o množství VFA tuku v těle. Dokáže odlišit, do jaké míry se na Vaší hmotnosti podílí tuk a do jaké svaly. Díky tomu Vám může určit míru rizika onemocnění na nemoci spojené s obezitou.

V rozsahu naleznete průměrné riziko onemocnění populace na nemoci spojené s obezitou. V případě, že je Váš výsledek nižší, riziko je menší.

Vyšší výsledek znamená vyšší riziko onemocnění.

$$\text{ABSI} = \text{obvod pasu} / \text{BMI}^{2/3} \times \text{výška}^{1/2}$$



Bazální metabolický výdej je množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno. Výdej energie v tomto stavu, je dán pouze prací (fungováním) životně důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže.

Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebných pro pokrytí denních pohybových aktivit. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje.

BMR se snižuje s věkem a s úbytkem svalové hmoty. Naopak se zvyšuje díky aerobnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty. Klidový energetický výdej může ovlivnit i jídlo, které během dne konzumujeme, nápoje a také množství stresu.

Pokud se Váš bazální metabolický výdej pohybuje pod normálním rozsahem, tak se doporučuje zvýšit svalovou hmotu pomocí silového cvičení.

BMR se také používá pro výpočet denního celkového energetického výdeje (TEE), vynásobením koeficientu fyzické aktivity 1.3, která je založena na nízké aktivitě.

Příklad: BMR 1200kcal, TEE doporučené je 1200x1.3 = 1560kcal

BMA neboli metabolický věk je v dnešní době poměrně nový údaj. Vyjadřuje se jím číslo vypočítané jako srovnání hodnoty Vašeho (**BMR**) s průměrnou hodnotou této veličiny u lidí stejného věku. Pokud je číslo příliš vysoké, nepamikařte a poraďte se s poradcem či lékařem.





Pvs 04.01.2026 9:27

BMR
1500-2000 Kcal

Základem je pravidelná a bohatá strava.
Ukládka jak může vypadat, je zde.

PONDĚLÍ

- Žitný chléb (2x50 g) se sýrem cottage s pažitkou (100 g), okurka (100 g), rajče (50 g), zelený čaj
- Ovocný salát (250 g) z manga a hroznového vína, Actimel natur (94 ml)
- Losos (150 g), vařené brambory ve slupce (250 g), okurkový salát s biokysem (200 g)
- Jogurt bílý nízkotučný (150 g), Knäckebrot (27 g = 3 plátky)
- Sójový rohlík (60 g), lučina (50 g), šunka kuřecí (min. 90 % masa)(40 g) kedlubna (100 g)
- Mrkev čerstvá (150 g)

ÚTERÝ

- Dalaňák celozrnný (80 g), tvarohová pomazánka (1 porce), paprika (100 g)
- Jablko (100 g), kyška Olma (400 ml)
- Celozrnné těstoviny (70 g v suchém stavu) s restovaným kuřecím masem (100 g), bazalkové pesto
- Chléb celozrnný fit (28 g) = 1 plátek, tvarohová pomazánka (1 porce)
- Chléb vícezrnný (60 g), Flora (5 g), šunka krutí (40 g), paprika (70 g), rajče (60 g)
- Ananas čerstvý (90 g)

STŘEDA

- Chléb slunečnicový celozrnný (60 g), cottage cheese (150 g), kedlubna (100 g)
- Activia kysaný nápoj Lehká a Fit černý rybíz (320 g), hroznové víno (150 g)
- Rizoto s drůbežím masem (100 g prs, 80 g rýže, 10 g 30% Eidamu), kompot broskvový (80 g)
- Be-Be Dobré ráno 2 sušenky (25 g), jogurt bílý nízkotučný (150 g)
- Krutí rolka plněná špenátem (1 porce) s brambory (100 g)
- Pomeranč (140 g) = cca 1 kus

ČTVRTEK

- Míchaná vejce 1 ks (50 g), bez oleje, paprika (80 g), celozrnné kukuřičné plátky Active (30 g)
- Jablko (100 g), bílý jogurt (125 g), Be-Be Dobré ráno 2 ks (25 g)
- Kuřecí prsíčka s broskvemi (150 g), vařené brambory (150 g), ananasový kompot (80 g)
- Pomeranč (150 g), Be-Be Dobré ráno 2 ks (25 g)
- Tuňák ve vlastní šťávě 100g, rajčata 70g, celozrnný dalaňák 60g
- Červená paprika masitá (130 g)


PÁTEK

- Ovocný tvaroh Milko (140 g), křehké grahamové plátky Active Bona Vita (30 g)
- Směs oříšků a semínek (10 g), tvaroh (do 1 % tuku) (100 g), pomeranč (150 g)
- Hovězí na houbách (100 gr, rýže (60 g v suchém stavu), kompot (80 g)
- Jogurt bílý (125 g), jablko (100 g), cereální kaiserka (60 g)
- Cereální kaiserka (60 g), sýr Lučina (40 g), krutí šunka (40 g) okurkový salát (100 g)
- Mango (90 g)

JSTE HLADOVÝ?

VÁŠ ŽALUDEK MÁ OPRAVDU SVOU MYSL.

Zaživací systém obsahuje síť s miliony nervovými buňkami, která funguje jako autonomní druhý mozek. Tento tzv. „střevní mozek“, normálně známý jako **střevní nervový systém**, pomáhá kontrolovat svalové kontrakce a střevní sekrece. Rovněž vyrovnává pocit hladu a nasycení, nebo pocit přeplnění a předává tyto informace do mozku.




JSEM TADY A JSEM HLAD!

Tělo je v pozici nepřetržitěho pocitu hladu. Ale existují některé faktory sytosti, které dočasně pocit hladu utiší.

Tady jsou nějaké případy, jak střevní mozek předává informace velkému mozku o plnosti.


ROZTAHOVÁNÍ ŽALUDKU

Po vstupu jídla do žaludku se žaludek roztáhne a „střevní mozek“ pošle zprávu do velkého mozku.



SNÍŽOVÁNÍ PEPTIDU

„Střevní mozek“ pocítí přítomnost živin v gastrointestinálním traktu a to stimuluje snižování peptidů do krve.



ILEÁLNÍ BRZDA

Pokud je v žaludku velké množství tuků, které mají být vstřebány, během tzv. ileální brzdy vyšle „střevní mozek“ zprávu do velkého mozku o přesycenosti.



KREVNÍ TLAK

0 mmHg

rozsah

>139

Systolický (maximální) krevní tlak

0 mmHg

rozsah

>89

Diastolický (minimální) krevní tlak

0 tep/m

Průměrný tep srdce


GLUKÓZA

mmol/L

Hladina glukózy v krvi

Výsledky krevního tlaku (nad 16 let)

* Pouze lékař je kvalifikovaný pro interpretaci významu měření krevního tlaku.



(Reference: ESC-ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, 2018)



Změřili jste si váš krevní tlak?

Věnujte tedy prosím pozornost průvodci vašeho výsledného listu.

SYSTOLICKÝ KREVNÍ TLAK

Systolický 98 mmHg

Tlak krve působící na stěnu tepny po stlačení srdečního svalu.

Tlak nižší než 120 mmHg snižuje riziko onemocnění spojené s hypertenzí, jako je onemocnění srdce, mozková příhoda, selhání ledvin, atp.

STŘEDNÍ ARTERIÁLNÍ TLAK (M.A.P)

M.A.P 70 mmHg

Je průměrný tlak v tepnách během jednoho srdečního cyklu, který může poukazovat na prokrvení a efektivitu distribuce živin k různým orgánům.

Normální rozsah MAP: 70 – 100 mmHg

PULS (TEP)

Puls 74 bpm

Je číslo ukazující počet úderů srdce za minutu. Nízká tepová frekvence během odpočinku může naznačovat účinnou funkci srdce a kardiovaskulární zdatnost.

Normální rozsah: 60 – 100 BPM

DIASTOLICKÝ KREVNÍ TLAK

Diastolický 60 mmHg

Tlak krve působící na stěnu tepny po uvolnění srdečního svalu.

Tlak nižší než 80 mmHg snižuje riziko onemocnění spojené s hypertenzí.

PULSNÍ TLAK (P.P)

P.P 41 mmHg

Je číselný rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem, který může poukazovat na zdraví koronárních tepen srdce.

Tlak mezi 40 a 60 mmHg je doporučovaný pro dobrou regulaci srdečního zdraví.


RATE PRESSURE PRODUCT (R.P.P)

R.P.P 7252


Je produkt systolického krevního tlaku a srdeční frekvence, který může poukazovat na požadavek myokardu na kyslík.

Body-vision History


HMOTNOST TĚLA




SMM (kosterní sval)




TĚLESNÝ TUK



PBF (% tuku v těle)



VFA (útrobní tuk)





Vaše doporučená cílová hmotnost by mohla být

81,7 kg

Doporučená změna množství Vaší svalové hmoty

0 kg

Doporučená změna množství Vašeho tělesného tuku

0 kg

„Doporučené hodnoty jsou stanovovány dle WHO - mezinárodní zdravotnická organizace“

Hodnota Vaší tělesné hmotnosti dosahuje ideálního rozmezí. Důležitá je však také kontrola objemu svalové a tukové složky ve Vašem těle. Zvýšenou pozornost proto věnujte následujícím parametrům.

Vaše tělo obsahuje nadprůměrný objem svalové hmoty, tato situace poukazuje na vysokou kvalitu Vaší fyzické kondice. Vaší snahou by mělo být zabránit případné ztrátě aktivní tělesné hmoty vlivem nepřiměřených stravovacích zásahů a eliminací fyzického zatěžování.




VYHODNOCENÍ VFA

Množství viscerálního tuku ve Vašem těle dosahuje přiměřené hodnoty vzhledem k Vašemu věku.

Naměřená hodnota

32,9 cm²



Nízký obsah tuku ve Vašem těle může negativně ovlivňovat funkci tělesných orgánů včetně pohybového, termoregulačního i imunitního systému. Snažte se vyrovnat Vaši energetickou bilanci. Zvyšte příjem kvalitních živin v poměru 15 % bílkovin, 30 % tuků, 55 % sacharidů. Nezapomínejte na doporučené denní dávky vitamínů a minerálních látek včetně dodržování pitného režimu.

Obsah viscerálního tuku ve Vašem těle přímo neohrožuje Vaše zdraví. S největší pravděpodobností věnujete dostatek pozornosti životnímu stylu, výživovým zvyklostem a pohybovým činnostem. Budiž Vám odměnou nízký obsah viscerálního tuku v oblasti břišní dutiny a s tím spojený dobrý zdravotní stav. Nesmíte ovšem zapomínat, že tato odměna plyne z Vašeho aktivního přístupu k životu a práce s Vaším tělem. Jakýkoliv nepříznivý zásah může množství viscerálního tuku ve Vašem těle negativně ovlivnit. Snažte se nepolevit a nezapomínejte na pravidelnou diagnostiku, která Vám bude nápomocna v průběhu celého Vašeho života.



VYHODNOCENÍ BMR

Hodnota Vašeho bazálního metabolismu je

1956 Kcal

Metabolické procesy ve Vašem těle jsou zrychlené. Vaše tělo rychle využívá živiny přijímané potravou, méně ukládá do zásob.



Hodnota Vašeho bazálního metabolismu se pohybuje v ideálním rozmezí. To znamená, že je Vaše tělo schopno přijmout a zpracovat objem přijatých živin v souladu s Vaším energetickým výdejem. Snažte se nenarušit tento vzácný stav organismu dlouhodobým přejídáním či hladověním. Obě tyto situace mohou nepříznivě a mnohdy také nezvratně ovlivnit metabolické procesy ve Vaše těle.